# **IN A NUTSHELL**

la plateforme de connaissances innovante pour les généralistes

# Score de Wells pour la thrombose veineuse profonde

S'appuyant sur des données d'anamnèse et des critères cliniques, le score de Wells pour la thrombose veineuse profonde (TVP) permet d'établir la probabilité d'être en présence d'une TVP. La probabilité pré-test qui en résulte aboutit à des recommandations pour la suite des démarches diagnostiques.

Cancer actif	
Traitement au cours des 6 derniers mois ou palliation	
○ Non ○ Oui (+1)	
Paralysie, parésie ou immobilisation récente des membres inférieurs	
○ Non ○ Oui (+1)	
Alitement (? 3 jours) ou chirurgie majeure dans les 12 semaines passée	S
○ Non ○ Oui (+1)	
Douleur localisée ou induration le long des veines profondes	
○ Non ○ Oui (+1)	
Enflure globale de la jambe	
○ Non ○ Oui (+1)	
Enflure du mollet (? 3 cm) vs jambe asymptomatique	
mesuré 10 cm sous la tubérosité tibiale	
○ Non ○ Oui (+1)	
Œdème prenant le godet du côté symptomatique	
○ Non ○ Oui (+1)	
Présence de veines collatérales superficielles (non variqueuses)	
○ Non ○ Oui (+1)	
TVP démontrée antérieurement	
○ Non ○ Oui (+1)	
Diagnostic alternatif au moins aussi probable que la TVP	
○ Non ○ Oui (-2)	
Score de Wells pour la thrombose veineuse profonde:	
Recommandation:	

#### Interprétation

## **Score** Classification et recommandation

## Thrombose veineuse improbable

- Recommandation: dosage des D-dimères
  - Des D-dimères négatifs permettent d'exclure la TVP
  - En cas de D-dimères positifs, écho-doppler pour exclure la TVP
- 7 2 Thrombose veineuse profonde probable
  - Recommandation : écho-doppler immédiat pour exclure la TVP

#### Références

1. Wells PS, Anderson DR, Rodger M et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. N Engl J Med 2003; 349: 1227-1235