

IN A NUTSHELL

Die Wissensplattform für Hausärztinnen und Hausärzte

NAFLD Fibrose Score

Mit dem NAFLD Fibrose Score (Tabelle) wird bei Patientinnen und Patienten mit einer nicht-alkoholischen Fettleber (NAFLD, engl. «nonalcoholic fatty liver disease») aufgrund einer Tabelle das Ausmass einer Leberfibrose abgeschätzt. Somit kann ohne Leberbiopsie eine fortgeschrittene Leberfibrose identifiziert werden.

Alter

Jahre

BMI (berechnen)

kg/m²

AST

U/l

ALT

U/l

Thrombozyten

G/l

Albumin

g/l ?

Gestörte Nüchtern glukose oder Diabetes mellitus

Ja Nein

NAFLD Fibrose:

Interpretation

NAFLD Fibrose Score Grad der Fibrose

< -1.455

F0-F2

Interpretation

Keine signifikante Fibrose (Wahrscheinlichkeit 93 %)

NAFLD Fibrose Score	Grad der Fibrose	Interpretation
-1.455 bis 0.676	Unbestimmt	Leberbiopsie erwägen
> 0.676	F3-F4	Signifikante Fibrose (Wahrscheinlichkeit 90 %)

Referenzen

1. Angulo P, Hui JM, Marchesini G et al. The NAFLD fibrosis score: a noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. *Hepatology* 2007; 45: 846-854